The group G is isomorphic to the group labelled by [1092, 25] in the Small Groups library.

Ordinary character table of $G \cong$ PSL(2,13):

	1a	2a	3a	6a	7a	7b	7c	13a	13b
χ_1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
χ_2	7	−1	1	−1	0	0	0	$-E(13)^2-E(13)^5-E(13)^6-E(13)^7-E(13)^8-E(13)^{11}$	$-E(13)-E(13)^3-E(13)^4-E(13)^9-E(13)^{10}-E(13)^{12}$
χ_3	7	−1	1	−1	0	0	0	$-E(13)-E(13)^3-E(13)^4-E(13)^9-E(13)^{10}-E(13)^{12}$	$-E(13)^2-E(13)^5-E(13)^6-E(13)^7-E(13)^8-E(13)^{11}$
χ_4	12	0	0	0	$-E(7)^3-E(7)^4$	$-E(7)-E(7)^6$	$-E(7)^2-E(7)^5$	−1	−1
χ_5	12	0	0	0	$-E(7)^2-E(7)^5$	$-E(7)^3-E(7)^4$	$-E(7)-E(7)^6$	−1	−1
χ_6	12	0	0	0	$-E(7)-E(7)^6$	$-E(7)^2-E(7)^5$	$-E(7)^3-E(7)^4$	−1	−1
χ_7	13	1	1	1	−1	−1	−1	0	0
χ_8	14	2	−1	−1	0	0	0	1	1
χ_9	14	−2	−1	1	0	0	0	1	1

Trivial source character table of G $\cong$ PSL(2,13) at p = 2

Normalisers N_i	N_1							N_2		N_3		
p − subgroups of G up to conjugacy in G	P_1							P_2		P_3		
Representatives $n_j \in N_i$	1a	3a	7a	7b	7c	13a	13b	1a	3a	1a	3a	3a
$1 \cdot \chi_1 + 1 \cdot \chi_2 + 0 \cdot \chi_3 + 0 \cdot \chi_4 + 0 \cdot \chi_5 + 0 \cdot \chi_6 + 1 \cdot \chi_7 + 0 \cdot \chi_8 + 0 \cdot \chi_9$	28	4	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
$0 \cdot \chi_1 + 0 \cdot \chi_2 + 1 \cdot \chi_3 + 0 \cdot \chi_4 + 0 \cdot \chi_5 + 0 \cdot \chi_6 + 1 \cdot \chi_7 + 0 \cdot \chi_8 + 0 \cdot \chi_9$	20	2	−1	−1	−1	$-E(13)-E(13)^3-E(13)^4-E(13)^9-E(13)^{10}-E(13)^{12}$	$-E(13)^2-E(13)^5-E(13)^6-E(13)^7-E(13)^8-E(13)^{11}$	0	0	0	0	0
$0 \cdot \chi_1 + 1 \cdot \chi_2 + 0 \cdot \chi_3 + 0 \cdot \chi_4 + 0 \cdot \chi_5 + 0 \cdot \chi_6 + 1 \cdot \chi_7 + 0 \cdot \chi_8 + 0 \cdot \chi_9$	20	2	−1	−1	−1	$-E(13)^2-E(13)^5-E(13)^6-E(13)^7-E(13)^8-E(13)^{11}$	$-E(13)-E(13)^3-E(13)^4-E(13)^9-E(13)^{10}-E(13)^{12}$	0	0	0	0	0
$0 \cdot \chi_1 + 0 \cdot \chi_2 + 0 \cdot \chi_3 + 0 \cdot \chi_4 + 0 \cdot \chi_5 + 1 \cdot \chi_6 + 0 \cdot \chi_7 + 0 \cdot \chi_8 + 0 \cdot \chi_9$	12	0	$-E(7)-E(7)^6$	$-E(7)^2-E(7)^5$	$-E(7)^3-E(7)^4$	−1	−1	0	0	0	0	0
$0 \cdot \chi_1 + 0 \cdot \chi_2 + 0 \cdot \chi_3 + 0 \cdot \chi_4 + 1 \cdot \chi_5 + 0 \cdot \chi_6 + 0 \cdot \chi_7 + 0 \cdot \chi_8 + 0 \cdot \chi_9$	12	0	$-E(7)^2-E(7)^5$	$-E(7)^3-E(7)^4$	$-E(7)-E(7)^6$	−1	−1	0	0	0	0	0
$0 \cdot \chi_1 + 0 \cdot \chi_2 + 0 \cdot \chi_3 + 1 \cdot \chi_4 + 0 \cdot \chi_5 + 0 \cdot \chi_6 + 0 \cdot \chi_7 + 0 \cdot \chi_8 + 0 \cdot \chi_9$	12	0	$-E(7)^3-E(7)^4$	$-E(7)-E(7)^6$	$-E(7)^2-E(7)^5$	−1	−1	0	0	0	0	0
$0 \cdot \chi_1 + 0 \cdot \chi_2 + 0 \cdot \chi_3 + 0 \cdot \chi_4 + 0 \cdot \chi_5 + 0 \cdot \chi_6 + 0 \cdot \chi_7 + 1 \cdot \chi_8 + 1 \cdot \chi_9$	28	−2	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
$1 \cdot \chi_1 + 0 \cdot \chi_2 + 0 \cdot \chi_3 + 0 \cdot \chi_4 + 0 \cdot \chi_5 + 0 \cdot \chi_6 + 1 \cdot \chi_7 + 0 \cdot \chi_8 + 0 \cdot \chi_9$	14	2	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0
$0 \cdot \chi_1 + 0 \cdot \chi_2 + 0 \cdot \chi_3 + 0 \cdot \chi_4 + 0 \cdot \chi_5 + 0 \cdot \chi_6 + 0 \cdot \chi_7 + 1 \cdot \chi_8 + 0 \cdot \chi_9$	14	−1	0	0	0	1	1	2	−1	0	0	0
$1 \cdot \chi_1 + 0 \cdot \chi_2 + 0 \cdot \chi_3 + 0 \cdot \chi_4 + 0 \cdot \chi_5 + 0 \cdot \chi_6 + 0 \cdot \chi_7 + 0 \cdot \chi_8 + 0 \cdot \chi_9$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
$0 \cdot \chi_1 + 0 \cdot \chi_2 + 0 \cdot \chi_3 + 0 \cdot \chi_4 + 0 \cdot \chi_5 + 0 \cdot \chi_6 + 1 \cdot \chi_7 + 0 \cdot \chi_8 + 0 \cdot \chi_9$	13	1	−1	−1	−1	0	0	1	1	1	$E(3)$	$E(3)^2$
$0 \cdot \chi_1 + 0 \cdot \chi_2 + 0 \cdot \chi_3 + 0 \cdot \chi_4 + 0 \cdot \chi_5 + 1 \cdot \chi_6 + 1 \cdot \chi_7 + 0 \cdot \chi_8 + 0 \cdot \chi_9$	13	1	−1	−1	−1	0	0	1	1	1	$E(3)^2$	$E(3)$

$P_1 = Group([()]) \cong 1$
$P_2 = Group([(1,5)(2,4)(6,13)(7,12)(8,11)(9,10)]) \cong$ C2
$P_3 = Group([(1,5)(2,4)(6,13)(7,12)(8,11)(9,10),(1,9)(3,14)(5,10)(6,12)(7,13)(8,11)]) \cong$ C2 x C2

$N_1 = Group([(1,12)(2,6)(3,4)(7,11)(9,10)(13,14),(1,6,11)(2,4,5)(7,8,10)(12,14,13)]) \cong$ PSL(2,13)
$N_2 = Group([(1,11,10)(2,7,13)(4,12,6)(5,8,9),(1,5)(2,4)(6,13)(7,12)(8,11)(9,10),(2,12)(3,14)(4,7)(6,13)(8,9)(10,11)]) \cong$ D12
$N_3 = Group([(2,11,14)(3,4,8)(5,9,10)(6,13,7),(1,5)(2,4)(6,13)(7,12)(8,11)(9,10),(1,9)(3,14)(5,10)(6,12)(7,13)(8,11)]) \cong$ A4